



لطلب المذكرات
60084568



للاشتراك بالمراجعات الحضورية
50855008

المادة **كيمياء** الصف **الثاني عشر**

مذكرات 2025



مؤسسة سما التعليمية
حولي مجمع بيروت الدور الأول

+ @samakw_net

www.samakw.com

يجب عدم إحراق علب الرذاذ حتى ولو كانت فارغة

لأن زيادة درجة الحرارة تزيد معدل التصادمات فيزداد الضغط داخل العبوة فتنفجر.

هملأ إطارات السيارة بالهواء صيفاً أقل منها شتاءً

لأنه حسب قانون بواي لوجاك: يتناسب ضغط الغاز طردياً مع درجة الحرارة المطلقة عند

ثبات الحجم وعدد المولات [زيادة T ← زيادة التصادمات ← زيادة الضغط ← ينفجر]

تستخدم الغازات في عمل الوسائد الهوائية في السيارات

لأن الغاز قابل للانضغاط فيمتص الطاقة الناتجة عن التصادمات فتحمي السائق

غبار الفحم المتناثر في الهواء أكثر خطورة على عمال المناجم من كتل الفحم الكبيرة

لأنه كلما صغر حجم الجسيمات تزداد مساحة السطح المعرض للتفاعل فيزداد معدل التصادمات فتزداد سرعة التفاعل والتأثر بها.

يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى زيادة سرعة التفاعل

زيادة درجة الحرارة ← زيادة طاقة الحركة للجسيمات ← يزداد معدل التصادمات بطاقة ← تزداد سرعة التفاعل

سرعة تفاعل الكربون مع الأكسجين (احتراق الفحم) بدرجة حرارة الغرفة تساوي صفر

لأن التصادمات لا تكون نشطة بطاقة كافية لكسر الروابط (O-O) و (C-C)

التفاعل التالي يعتبر عكسي متجانس: $2CO_{(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2CO_{2(g)}$

لأنه لا يستمر في اتجاه واحد وجميع المواد المتفاعلة والناتجة في حالة واحدة (g)

لا يتأثر موضع الاتزان التالي: $H_{2(g)} + F_{2(g)} \rightleftharpoons 2HF_{(g)}$ بزيادة الضغط

أو في الاتزان التالي: $3Fe_{(s)} + 4H_2O_{(g)} \rightleftharpoons Fe_3O_{4(s)} + 4H_{2(g)}$

لأن عدد مولات الغاز في الطرفين متساو

(التركيز أو الضغط) لا يؤثر على قيمة K_{eq}

لأن تأثيرهما على المتفاعل والناتج بنفس النسبة فبقي النسبة بينهما

ثابتة ← لا تتأثر قيمة K_{eq}

لا يعتبر الميثان CH_4 من الأحماض رغم احتوائه على أربع ذرات H

لأنه لا يحتوي على أي ذرة H قابلة للتأين «روابط تساهمية غير قطبية»

تعتبر $NaOH$ من قواعد أرهينيوس لأنها تنقل في الماء لتغطي أيون الهيدروكسيد



يعتبر (الماء أو الأمونيا) من مترددات برونستد-لوري.



لأن لها القدرة على منح زوج إلكترونات حر لمادة أخرى NH_3 :

يعتبر HCl حمضاً قوياً بينما CH_3COOH حمضاً ضعيفاً. [حمض الهيدروكلوريك] [حمض الأسيتيك]

لأن HCl يتأين بشكل تام في محلوله المائي بينما يتأين CH_3COOH جزئياً:



ماذا نتوقع أن يحدث:

- لحجم غاز في الدرجة $200K$ عند رفع الدرجة إلى $400K$ مع بقاء الضغط ثابت

الحدث: يتضاعف الحجم

السبب: حسب قانون تشارلز « تتناسب حجم الغاز طردياً مع درجة الحرارة

المطلقة عند ثبات الضغط وعدد المولات »

- عند استمرار الضغط على زر عبوة الرذاذ

الحدث: يتغير الضغط

السبب: لأن مولات الغاز تنقل من داخل العبوة إلى خارجها

فيقل عددها فيقل الضغط « تتناسب طردي بين P و n »

- لتنفس متسلق الجبال عند صعوده إلى قمة جبل إفرست

الحدث: يصعب

السبب: لأنه في أعالي الجبال ينخفض الضغط الجوي فيقل الضغط الجزئي

لغاز الأكسجين عن الحد المسموح للتنفس

ماذا نتوقع أن يحدث لسرعة التفاعل عند:

• استخدام مادة مانعة

تتخفض سرعة التفاعل

لأن المادة المانعة ترفع مستوى حاجز التنشيط.

• استخدام مادة حفزة

تزداد سرعة التفاعل

لأن المادة المحفزة تخفض مستوى حاجز التنشيط.

الحدث:

السبب:

- لتوهج رقاقة خشب مشتعلة عند وضعها في مخبر مهلوء بغاز الأكسجين
الحدث: يزداد توهجها.

السبب: بسبب زيادة تركيز غاز الأكسجين فيزداد معدل التصادمات
فتزداد سرعة التفاعل « يزداد التوهج »

- لموضع الاتزان التالي عند رفع درجة الحرارة :



الحدث: ينزاح بالاتجاه العكسي

السبب: لأنه تفاعل طارد للحرارة ، وحسب مبدأ لوشاتلييه عند رفع درجة الحرارة
سينزاح موضع الاتزان بالاتجاه العاكس للحرارة « وهو العكسي »

- لقيمة الأس الهيدروجيني PH عند زيادة تركيز $[\text{H}_3\text{O}^+]$

الحدث: تقل قيمة PH

السبب: لأن $\text{PH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$ أي أنه بزيادة التركيز تقل PH
ويصبح المحلول حمضياً .


- لقيمة تركيز كاتيون الهيدرونيوم $[\text{H}_3\text{O}^+]$ عند إضافة حمول
قلوي إلى الماء النقي عند الدرجة 25°C

الحدث: يقل تركيز الهيدرونيوم $[\text{H}_3\text{O}^+]$


السبب: لأن إضافة القلوي تعني زيادة $[\text{OH}^-]$ وبما أن :

$$[\text{H}_3\text{O}^+].[\text{OH}^-] = 1 \times 10^{-14} \quad \text{إذا أصبح } [\text{H}_3\text{O}^+] > 1 \times 10^{-7} \text{ عند } 25^\circ\text{C}$$


• يكون الضغط المؤثر على الهواء المحبوس في الأنابيب التالية :



$$P = P_{\text{الجوي}} + P_{\text{Hg}}$$



$$P = P_{\text{الجوي}}$$



$$P = P_{\text{الجوي}} - P_{\text{Hg}}$$

اشترك في منصة سما ولا تحاتي

• الغاز يأخذ شكل الإناء الذي يوضع فيه بسبب انعدام قوى التجاذب والتنافر

• درجة الصفر المطلق تساوي 0°C أو 0 K

• حجم نصف مول من الغاز المثالي عند الظروف القياسية يساوي 11.2 L

• عند ثبات درجة الحرارة والحجم فإن مضاعفة عدد الجسيمات تؤدي إلى مضاعفة الضغط

• متوسط الطاقة الحركية لجسيمات الغاز تتناسب طردياً مع درجة الحرارة المطلقة.


• عدد الجزيئات في 2 L من N_2 يساوي عدد الجزيئات في 2 L من O_2 عند نفس الظروف

• إذا كانت $(N=14)$ فإن 7 g من غاز النيتروجين تشغل في الظروف القياسية حجماً 5.6 L

• " " $(\text{Ne}=20)$ " " 10 g " " النيون " " " " 11.2 L

• الحجم الذي تشغله كمية معينة من غاز عند الضغط 200 kPa ضعف الحجم الذي تشغله نفس الكمية عند الضغط 400 kPa بثبات درجة الحرارة.

• المول الواحد من الغاز يشغل في الظروف القياسية حجماً مدره 22.4 L تقريباً



• أقل كمية من الطاقة تحتاجها الجسيمات كي تتفاعل تسمى

طاقة التنشيط

• غبار الفحم أكثر نشاطاً من كتل الفحم الكبيرة

• المركب الذي يتكون عند قمة حاجز التنشيط يسمى المركب المنشط

• المادة المحفزة لا تظهر كإحدى المواد المتفاعلة أو الناتجة لأنها لا تستهلك أثناء التفاعل.

• عند الاتزان الديناميكي تثبت تراكيز المواد و تتساوى سرعة التفاعل الطردي والعكسي

• إذا كانت $(K_{eq} < 1)$ الاتجاه المفضل هو العكسي. ويزداد تكوين المواد المتفاعلة



تزداد سرعة التفاعل كلما زادت مساحة السطح للمادة المتفاعلة.

• تتغير قيمة K_{eq} « ثابت الاتزان » بتغير درجة الحرارة

• إذا كانت $K_{eq} = \frac{[\text{N}_2] \cdot [\text{H}_2]^3}{[\text{NH}_3]^2}$ فتكون معادلة التفاعل :



• إذا كانت قيمة $(K_{eq}=50)$ للتفاعل $A \rightleftharpoons B$ فإن K_{eq} للتفاعل $B \rightleftharpoons A$ تساوي 0.02

• في التفاعل الماص فإن قيمة K_{eq} تزداد بالتسخين، بينما في التفاعل الطارد تقل

• التركيز والضغط لا يؤثران على قيمة K_{eq} بينما تتغير قيمته بتغير درجة الحرارة

- في المخطط المقابل يكون :

* المنحنى الناتج عن وجود مادة محفزة هو **B** --

-----A----- " مائة " " " " " " *



* من باب زيادة الاهتمام بهذه المصطلحات وليس الحصر :

قانون بويل - الصفر المطلق - الغاز المثالي - الحجم المولي
الضغط الجزئي

سرعة التفاعل - طاقة التنشيط - المادة المتفاعلة

التفاعلات العكسية غير المتجانسة - الاتزان الديناميكي الكيميائي

محضر ارضينويوس - قاعدة لويس - المواد المترددة - القاعدة المراقبة

المحلول القاعدي - ثابت تأين الماء - التأين الذاتي للماء .

* هذه المصطلحات للتركيز عليها وليس كي ننكر

باني المصطلحات « انتبه » .



بشبات
T و n


$$P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2$$

بويل

جاي لوساك

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$

بشبات
V و n



$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

تشارلز

بشبات
P و n

الموحد

$$\frac{P_1 \cdot V_1}{T_1} = \frac{P_2 \cdot V_2}{T_2}$$

بشبات
n

$$T_K = t_{C^{\circ}} + 273$$

شعارنا « لا.. للسيليزي » نحول إلى كلفن


$$R = 8.31$$

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

الغاز المثالي :

أفوجدرو :

$$n = \frac{m_s}{M_{wt}} = \frac{N_u}{6 \times 10^{23}} = \frac{V_L}{22.4}$$



$$P_T = P_1 + P_2 + \dots$$

دالتون :



* الاتزان :

لا يدخلان في عبارة K_{eq}

الصلب و السائل
L S

$$K_{eq} = \frac{[C]^c \cdot [D]^d}{[A]^a \cdot [B]^b}$$

$$[\text{التركيز}] = \frac{n}{V_L}$$

الظروف القياسية
STP

$$P = 101.3 \text{ kPa}$$

$$T = 273 \text{ K}$$



حولي مجمع بيروت الدور الأول


اشترك في منصة سما ولا تحاتي

www.samakw.com



$$PH + POH = 14$$

المخطط
العجيب



$$PH = -\log[H^+]$$

$$POH = -\log[OH^-]$$

$$K_w = [H_3O^+] \cdot [OH^-] = 1 \times 10^{-14}$$

$$K_w = [H_3O^+]^2$$

$$K_w = [OH^-]^2$$

في الماء عند حرارة عالية

$$[H_3O^+] = [OH^-] = \sqrt{K_w}$$

المحاول

القاعدي

$$[H^+] < [OH^-]$$

$$[H^+] < 1 \times 10^{-7}$$

$$PH > 7$$

المتعاد

$$[H^+] = [OH^-]$$

$$[H^+] = 1 \times 10^{-7}$$

$$PH = 7$$

الحمضي

$$[H^+] > [OH^-]$$

$$[H^+] > 1 \times 10^{-7}$$

$$PH < 7$$

القواعد


ضعيفة
تأينها جزئي
 NH_3

قوية
تأينها تام
 $KOH, NaOH$

الأحماض

ضعيفة
تأينها جزئي
 HCN, HF, CH_3COOH

قوية
تأينها تام
 HNO_3, HCl, H_2SO_4



اشترك في منصة سما ولا تحاتي

* تحتوي أسطوانة حجمها (8.58 L) على كمية من غاز الأكسجين O_2 مبرها (89.6 g)، أحسب الضغط داخل الأسطوانة عند درجة الحرارة (21°C) علمًا أن ($R=8.31$, $M_{wt}=32$)

$$V = 8.58 L$$

$$m_s = 89.6 g$$

$$M_{wt} = 32$$

$$T = 21^\circ C + 273 = 294 K$$

$$R = 8.31 \quad P = ?$$

$$n = \frac{m_s}{M_{wt}} = \frac{89.6}{32} = 2.8 \text{ mol}$$

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

$$P \times 8.58 = 2.8 \times 8.31 \times 294$$

$$\Rightarrow P = 797.29 \text{ kPa}$$

* ليغن غاز عند الضغط (155 kPa) ودرجة الحرارة (25°C) حجمًا مقداره (1 L) عند زيادة الضغط إلى (605 kPa) ودرجة الحرارة إلى (125°C) أحسب الحجم النهائي.

$$P_1 = 155 \text{ kPa} \rightarrow P_2 = 605 \text{ kPa}$$

$$T_1 = 25^\circ C + 273 \rightarrow T_2 = 125^\circ C + 273$$

$$= 298 K \quad = 398 K$$

$$V_1 = 1 L \rightarrow V_2 = ?$$

$$\frac{P_1 \cdot V_1}{T_1} = \frac{P_2 \cdot V_2}{T_2}$$

$$\frac{155 \times 1}{298} = \frac{605 \times V_2}{398}$$

$$\Rightarrow V_2 = \frac{155 \times 1 \times 398}{298 \times 605} = 0.34 L$$

* يحتوي خليط غازي على أكسجين ونيتروجين وثاني أكسيد الكربون ويساوي ضغطه الكلي 32.9 kPa، فإذا علمت أنه:

$$P_{CO_2} = 6.6 \text{ kPa} \text{ و } P_{N_2} = 23 \text{ kPa} \text{ ، أحسب } P_{CO_2}$$

$$P_T = P_{O_2} + P_{N_2} + P_{CO_2}$$

$$32.9 = 6.6 + 23 + P_{CO_2}$$

$$P_{CO_2} = 32.9 - (6.6 + 23) = 3.3 \text{ kPa}$$



اشترك في منصة سما ولا تحاتي

* إذا كان حجم البالون مملوء بالغاز يساوي (15L) عند درجة الحرارة (40°C) وضغط (130 kPa)، أحسب حجم البالون عند الضغط ودرجة الحرارة القياسيين STP.

$$V_1 = 15L \rightarrow V_2 = ?$$

$$T_1 = 40^\circ C + 273 \rightarrow T_2 = 273K$$

$$= 313K$$

$$P_1 = 130 kPa \rightarrow P_2 = 101.3 kPa$$

$$\frac{P_1 \cdot V_1}{T_1} = \frac{P_2 \cdot V_2}{T_2}$$

$$\frac{130 \times 15}{313} = \frac{101.3 \times V_2}{273}$$

$$\rightarrow V_2 = 16.789 L$$

* أدخل مزيج من (H₂ و NO) في وعاء سعته 2L عند درجة حرارة معينة فحدث الاتزان التالي:

$$2NO_{(g)} + 2H_{2(g)} \rightleftharpoons N_{2(g)} + 2H_2O_{(g)}$$

وعند الاتزان وجد أن المخلوط يحتوي على: (H₂ من 0.02 mol)، (NO من 0.02 mol) و (N₂ من 0.15 mol) و (H₂O من 0.3 mol)، أحسب قيمة ثابت الاتزان K_{eq}.

* لم أحسب K_{eq} للاتزان:

$$N_{2(g)} + 2H_2O_{(g)} \rightleftharpoons 2NO_{(g)} + 2H_{2(g)}$$

$$[NO] = \frac{n}{V_L} = \frac{0.02}{2} = 0.01 M$$

$$[H_2] = \frac{0.02}{2} = 0.01 M$$

$$[N_2] = \frac{0.15}{2} = 0.075 M$$

$$[H_2O] = \frac{0.3}{2} = 0.15 M$$

$$K_{eq} = \frac{[N_2] \cdot [H_2O]^2}{[NO]^2 \cdot [H_2]^2}$$

$$= \frac{0.075 \times (0.15)^2}{(0.01)^2 \times (0.01)^2}$$

$$= 168.75$$

$$* K'_{eq} = \frac{1}{K_{eq}} = \frac{1}{168.75} = 0.0059$$

* في مسائل الغازات:

$$T_K = t_{C^\circ} + 273$$

- درجة الحرارة يجب أن تكون بالكلفن

- عندما يتغير الضغط مثلاً من 90 kPa إلى 120 kPa فإنه يكون:

$$P_2 = 120 \rightarrow P_1 = 90$$

- عندما يتغير من 90 kPa بمقدار 120 kPa فإنه يكون:

$$P_2 = 90 + 120 = 210 kPa \rightarrow P_1 = 90$$

نجمعهما



* إذا علمت أن قيمة K_{eq} تساوي 2.4×10^{-5}

للاتزان: $CaSO_4(s) \rightleftharpoons Ca^{2+}(aq) + SO_4^{2-}(aq)$
- أحسب تركيز كل أيون في المحلول عند الاتزان

$$K_{eq} = [Ca^{2+}] \cdot [SO_4^{2-}]$$

$$[Ca^{2+}] = [SO_4^{2-}]$$

$$\Rightarrow [Ca^{2+}] = [SO_4^{2-}] = \sqrt{K_{eq}}$$

$$= \sqrt{2.4 \times 10^{-5}} = 4.89 \times 10^{-3} M$$

* ترك محلول حمض الفورميك في الماء حتى حدث الاتزان التالي:



فإذا وجد أن تركيز كاتيون الهيدرونيوم عند الاتزان $4.2 \times 10^{-3} M$

فاحسب تركيز الحمض عند الاتزان علماً أن: $K_{eq} = 1.764 \times 10^{-4}$

$$K_{eq} = \frac{[HCOO^-] \cdot [H_3O^+]}{[HCOOH]}$$

$$[HCOO^-] = [H_3O^+] = 4.2 \times 10^{-3} M$$

$$1.764 \times 10^{-4} = \frac{(4.2 \times 10^{-3})^2}{[HCOOH]}$$



$$\Rightarrow [HCOOH] = \frac{(4.2 \times 10^{-3})^2}{1.764 \times 10^{-4}} = 0.1 M$$

* في مسألة K_{eq} : * لو أعطاك قيمة K_{eq} لمحلول ملح وطلب منك حساب تراكيز الأيونات « علماً أن الملح يتأين إلى عدد متساوٍ من المولات الخاصة بالأيونات »



* عندما يعطينا أعداد مولات فينا يجب أن نقسمها على الحجم بالتركيبة نحسب التراكيز ثم نعوض بعبارة ثابت الاتزان.



* محلول هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) تركيزه

(0.01 M) عند الدرجة 25°C ، أحسب كلاً من :

PH [3] $[H_3O^+]$ [4] $[OH^-]$ [5]

المحلول

قاعدي



$$[OH^-] = 0.01 M$$

$$[H_3O^+] = \frac{1 \times 10^{-14}}{0.01} = 1 \times 10^{-12} M$$

$$PH = -\log(1 \times 10^{-12}) = 12$$

* محلول عائي فيه الأيون الهيدروكسيدي P_{OH} يساوي (9) عند الدرجة 25°C

أحسب تركيز كاتيون الهيدرونيوم $[H_3O^+]$ و أنيون الهيدروكسيد $[OH^-]$

والأس الهيدروجيني PH .

رهل المحلول حمضي أم قاعدي أم متعادلي ؟ مع ذكر السبب .

$$P_{OH} = 9 \rightarrow PH = 14 - 9 = 5$$

$$\rightarrow [OH^-] = 10^{-P_{OH}} = 10^{-9} M$$

$$\rightarrow [H_3O^+] = \frac{1 \times 10^{-14}}{1 \times 10^{-9}} = 1 \times 10^{-5} M$$

* المحلول حمضي لأن $PH < 7$

* في مسألة PH : إذا أعطاك تركيز الهيدرونيوم أو تركيز

الهيدروكسيد للماء النقي عند درجة حرارة معينة وطلب حساب K_w

$$K_w = [H_3O^+]^2 = [OH^-]^2 \quad \leftarrow \text{يكون } [H_3O^+] = [OH^-] \text{ ونستخدم}$$

* أما لو أعطاك قيمة K_w للماء عند درجة حرارة معينة وطلب


حساب تركيز الهيدرونيوم أو الهيدروكسيد

$$[H_3O^+] = [OH^-] = \sqrt{K_w}$$

← نستخدم القانون

9- اكمل الجدول التالي الذي يوضح العلاقة بين ضغط كمية معينة من غاز ما و درجة حرارته المطلقة عند ثبوت الحجم . ثم أجب عن ما يلي :

T	P	
200 K	100 kPa	1
400 K	200 kPa	2
100 K	50 kPa	3
600 K	300 kPa	4



1- ما اسم القانون الذي يدرس هذه العلاقة جاي لوساك

2- ما العلاقة بين الضغط ودرجة الحرارة المطلقة ... طردية

3- كم تكون قيمة المقدار الثابت (K) : $\frac{P}{T} = 0.5$

4- اكتب العلاقة الرياضية لهذا القانون $\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$

5- ارسم علاقة بيانية بين الضغط و درجة الحرارة المطلقة:

الغاز الحقيقي	الغاز المثالي	وجه المقارنة
لا توجد	لا توجد	قوي التجاذب بين الجسيمات (توجد - لا توجد)
لا تهمل	تهمل	حجم الجسيمات بالنسبة لحجم الغاز (تهمل - لا تهمل)
لا يمكن	لا يمكن	احتمال الإسالة بالضغط والتبريد (يمكن - لا يمكن)

1- أمامك ثلاث بالونات (a , b , c) تحتوي علي ثلاث غازات مختلفة تحت نفس الظروف من الضغط و درجة الحرارة

a	b	c
N = 14	H = 1	O = 16
$m_s = 0.56 \text{ g}$	$m_s = 0.4 \text{ g}$	$m_s = 0.64 \text{ g}$

أجب عما يلي علما بأن (R = 8.31) :
 1- حجم البالون (a) ... أقل من ... حجم البالون (b)
 $n = \frac{m_s}{M_{mrt}}$ $\frac{0.56}{28}$ $\frac{0.4}{2}$ $\frac{0.64}{32}$

2- حجم غاز الهيدروجين داخل البالون (b) في الظروف القياسية يساوي 4.48 لتر


3- عدد جزيئات غاز الاكسجين داخل البالون (c) في الظروف القياسية تساوي 1.2×10^{22} لتر

4- عدد جزيئات الغاز داخل البالون (c) ... أقل من ... عدد جزيئات الغاز داخل البالون (b) تحت ظروف STP

5- حجم البالون (a) ... يساوي ... حجم البالون (c) . فسر اجابتك ؟

لأن عدد المولات في البالون a يساوي البالون c (أفوجادرو)

قم بدراسة المنحنى التالي وأجب عن الأسئلة التالية



الرمز	المفهوم
D	طاقة التنشيط في حالة استخدام مادة محفزة
E	طاقة التنشيط في حالة عدم استخدام مادة محفزة
B	طاقة المواد المتفاعلة
A	طاقة المواد الناتجة
F	المركب المنشط
C	الطاقة الناتجة من التفاعل

وجه المقارنة	قيمة ثابت الاتزان K_{eq} أكبر من 1	قيمة ثابت الاتزان K_{eq} أقل من 1
موضع الاتزان	الطردي	العكسي
تركيز المتفاعلات	أقل	أكبر
تركيز النواتج	أكبر	أقل

نوع التفاعل	طارد للحرارة	ماص للحرارة
قيمة ΔH	-	+
أثر زيادة الحرارة على قيمة K_{eq}	تقل	تزداد
أثر خفض الحرارة على قيمة K_{eq}	تزداد	تقل

م	الصيغة الكيميائية للحمض	القاعدة المرافقة له	الصيغة الكيميائية للقاعدة	الحمض المرافق لها
1	H_3O^+	H_2O	NO_3^-	HNO_3
2	$HClO_3$	ClO_3^-	NH_3	NH_4^+
3	HCO_3^-	CO_3^{2-}	CN^-	HCN
4	NH_4^+	NH_3	OH^-	H_2O
5	CH_3COOH	CH_3COO^-	Cl^-	HCl

م	الصيغة الكيميائية للحمض	اسم الحمض	الصيغة الكيميائية للحمض	اسم الحمض
1	$HClO$	حمض هيبوكلوروز	HNO_3	حمض النيتريك
2	$HClO_3$	حمض الكلوريك	H_2SO_4	حمض الكبريتيك
3	H_3PO_3	حمض فوسفوروز	H_2S	حمض هيدروكبريتيك
4	$HBrO_2$	حمض البروموز	HI	حمض الهيدرويوديك
5	HNO_3	حمض النيتريك	HIO_3	حمض اليوديك
6	$HBrO_4$	حمض بيربروميك	HCl	حمض الهيدروكلوريك
7	CH_3COOH	حمض الأسيتيك	H_3PO_4	حمض فوسفوريك
8	HNO_2	حمض النيتروز	H_2CO_3	حمض الكربونيك

1- اختر من القائمة (ب) ما يناسب القائمة (أ) بوضع الرقم المناسب أمامها بين القوسين :

م	القائمة (أ)	القائمة (ب)
1	محلول متعادل	pH = 5.6
2	محلول حمضي	$[H_3O^+] = [OH^-]$
3	محلول قاعدي	$-Log [H_3O^+]$
4	الأس الهيدروجيني	$[OH^-] = 3 \times 10^{-4}$
5	الأس الهيدروكسيدي	

وجه المقارنة	الحمض الأقوى (أكبر - أقل)	الحمض الأضعف (أكبر - أقل)
درجة التأين	أكبر	أقل
تركيز $[H_3O^+]$	أكبر	أقل
قيمة (K_a)	أكبر	أقل
قيمة (pH)	أقل	أكبر
تركيز $[OH^-]$	أقل	أكبر

وجه المقارنة	القاعدة الأقوى (أكبر - أقل)	القاعدة الأضعف (أكبر - أقل)
درجة التأين	أكبر	أقل
تركيز $[OH^-]$	أكبر	أقل
قيمة (pH)	أكبر	أقل
قيمة (K_b)	أكبر	أقل
تركيز $[H_3O^+]$	أقل	أكبر

تأين تام

1- الحمض القوي الذي له الصيغة الافتراضية HA يكون في محلوله المائي:

() متأين جزئياً . () تركيز الجزيء غير المتأين HA صفراً .

() يوجد في حالة اتزان ديناميكي . () تركيز كاتيون الهيدروجين أقل من تركيز الحمض .

2- المواد التالية تعتبر تامة التأين (أو التفكك) في المحاليل المائية عدا واحدة منها ، وهي :

HCl ()

NH₃ () ← ضعيف

HNO₃ ()

NaOH ()

3- يحتوي المحلول المائي لهيدروكسيد الصوديوم (NaOH) على :

() أنيونات (OH^-) ، كاتيونات (Na^+) وحدات صيغة (NaOH)

() أنيونات (OH^-) وحدات صيغة (NaOH)

() كاتيونات (Na^+) فقط

() أنيونات (OH^-) ، كاتيونات (Na^+) فقط

4- الأنواع الموجودة في المحلول المائي لحمض الأسيتيك (CH₃COOH) :

() H_3O^+ ، CH_3COOH فقط .

() H_3O^+ ، CH_3COO^- فقط .

() CH_3COOH ، H_3O^+ ، CH_3COO^- ()

() H_3O ، CH_3COO^- فقط .

