

الكيمياء

مذكرة

للفصل الثاني عشر

الفصل الدراسي الأول



مقدمة

الأحماض و القواعد

الوحدة الثالثة :

- 1) يعتبر الخل والليمون من **الحمضيات** ويعتبر الثوم والكافيين من **القواعد**...
- 2) يحتوي الخل على حمض **الأسيتيك** ويحتوي الليمون على حمض **الستريك** وتحتوي الطماطم على حمض **الاسكوربيك** ويحتوي الشاي على **النانيك**..
ويبنى حمض **اللاكتيك**.. في عضلات الجسم خلال التمرين
- 3) تفرز الرخويات البحرية حمض **الكبريتيك** للدفاع عن نفسها
- 4) تنتج الطيور البحرية خليطاً حمضياً من زيوت السمك نصف المهضومة ذات رائحة كريهة **لإبعاد أعدائها**

خواص القواعد	خواص الأحماض
ملمسها زلق . وطعمها مرّ (صابون)	طعمها لاذعكالخل
تتفاعل مع الأحماض لتكوّن ملح .. وماء	تتفاعل مع القواعد لتكوّن ملح .. وماء
تغيّر ألوان أدلة ورقة تباع الشمس من الأحمر .. إلى الأزرق	تغيّر ألوان أدلة ورقة تباع الشمس من الأزرق .. إلى الأحمر
موصلة للتيار الكهربائي (إما إلكترونات قوية ..) هيدروكسيد الصوديوم NaOH (إما إلكترونات ضعيفة ..) الأمونيا NH3	تتفاعل مع الفلزات لإنتاج غاز الهيدروجين H_2 والمحاليل المائية موصلة للتيار الكهربائي إما إلكترونات ضعيفة .. كحمض الأسيتك وإما CH3COOH إلكترونات قوية .. كحمض الهيدروكلوريك HCl

أحماض و قواعد أرهينيوس

أولاً :

أحماض أرهينيوس : مركبات تحتوي على هيدروجين وتتأين لتعطي كاتيونات الهيدروجين H^+ في المحلول المائي H_3O^+

قواعد أرهينيوس : المركبات التي تحتوي على مجموعة الهيدروكسيد وتتفكك لتعطي أنيونات الهيدروكسيد OH^- في المحلول المائي

أحماض ثلاثية البروتون

الأحماض التي تحتوي على ثلاث ذرات هيدروجين قابلة للتأين



أحماض ثنائية البروتون

الأحماض التي تحتوي على ذرتي هيدروجين قابلتين للتأين .



أحماض أحادية البروتون

الأحماض التي تحتوي على ذرة هيدروجين واحدة قابلة للتأين .



تفسير بعض التعاليل

[1] لا يعتبر الميثان CH_4 من الاحماض بالرغم من احتوائه على اربع ذرات هيدروجين

[2] حمض الاستيك CH_3COOH يحتوي على اربع ذرات هيدروجين و لكنه أحادي البروتون

[3] يمكن تحضير محلول مركز من هيدروكسيد الصوديوم و لا يمكن تحضير محلول مركز من هيدروكسيد الكالسيوم

[4] تسبب المحاليل المركزة للقواعد القوية كهيدروكسيد الصوديوم ألماً شديداً وتآكلاً للجلد ولا يلتئم الجرح الذي تسببه بسرعة لذلك يجب غسلها وإزالتها عن الجلد بالماء في حال لمسها أو انسكابها

[5] يعتبر HCl من احماض أرهينبيوس .

[6] يعتبر NaOH من قواعد أرهينبيوس

ثانياً :

أحماض و قواعد برونستد - لوري

حمض برونستد-لوري : المادة (جزيء أو أيون) التي **تعطي** كاتيون

الهيدروجين H^+ (بروتون) لمادة أخرى ويسمى معطي البروتون



قاعدة برونستد-لوري : المادة (جزيء أو أيون) التي **تستقبل** كاتيون

الهيدروجين H^+ (بروتون) من مادة أخرى ويسمى مستقبل البروتون



علل فشل أو قصور تعريف أرهينيوس :

١- اقتصرت تعريفه على مذيب واحد « الماء »

٢- فشل في تفسير حمضية بعض المركبات التي لا تحتوي H^+ مثل NH_4Cl

٣- فشل في تفسير قاعدية بعض المركبات التي لا تحتوي OH^- مثل NH_3

المواد المترددة :

هي المواد التي يمكنها أن تسلك كحمض عندما تتفاعل مع القاعدة ،
كما يمكنها أن تسلك كقاعدة عندما تتفاعل مع الحمض.




علل : يعتبر (الماء أو الأمونيا) من مترددات بر ونشتد- لورى

الأزواج المترافقة

الجزء المتبقي من الحمض بعد فقد البروتون يسمى _____

الجزء الناتج من القاعدة بعد استقبال البروتون يسمى _____

كل حمض وقاعدته المترافقة ، أو كل قاعدة وحمضها المترافق
تسمى _____



				حمض
SO_4^{2-}	HSO_4^-	H_2O	Cl^-	قاعدة

NH_4^+	HCO_3^-	H_2CO_3		حمض
			CH_3COO^-	قاعدة


أحماض و قواعد لويس

ثالثاً :

حمض لويس: المادة (الجزيئات أو الأيونات) التي لها القدرة على **استقبال** زوج من الإلكترونات الحرة لتكوين رابطة تساهمية مع جزيئات أخرى .

قاعدة لويس: المادة (الجزيئات أو الأيونات) التي لها القدرة على **إعطاء** زوج من الإلكترونات الحرة لتكوين رابطة تساهمية مع جزيئات أخرى.

$B: 2, [3]$ $N: 2, [5]$ $O: 2, [6]$



1] يعتبر كل من $AlCl_3$, BF_3 لويس لأن الذرة المركزية

على الكترونات حرة

2] تعتبر الكاتيونات مثل NH_4^+ لويس

3] تعتبر الانيونات مثل Cl^- لويس

4] تعتبر المركبات التي تحتوي على النيتروجين مثل NH_3

من لويس

تفسير بعض التعاليل

1- يعتبر ثالث كلوريد الفوسفور (PCl_3) قاعدة لويس.

2- يعتبر كاتيون الهيدروجين $[\text{H}^+]$ من أحماض لويس

للتذكير:

النظرية	تعريف الحمض	تعريف القاعدة
أرهينيوس	تعطي كاتيون هيدروجين H^+	تعطي أنيون هيدروكسيد OH^-
بر ونشتد-لورى	تعطي كاتيون هيدروجين H^+	تستقبل كاتيون هيدروجين H^+
لويس	تستقبل زوج من الإلكترونات الحرة	تعطي زوج من الإلكترونات الحرة

مراجعة الأحماض و القواعد :

1- أحد المركبات التالية يمكن اعتباره حمضاً حسب مفهوم أرهينيوس :

CH_4 () NH_3 ()

H_2S () LiH ()

2- الحمض حسب مفهوم برونستد - لوري في التفاعل التالي: $\text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{NH}_3$ هو:

H_3O^+ () NH_3 ()

NH_4^+ () H_2O ()

4- أحد الأزواج التالية لا يكون زوجاً مترافقاً حسب مفهوم برونستد - لوري للأحماض والقواعد :

OH^- ، NaOH () NH_4^+ ، NH_3 ()

H_2S ، HS^- () OH^- ، H_2O ()

5- في التفاعل التالي : $\text{HF}_{(g)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+_{(aq)} + \text{F}^-_{(aq)}$ الحمض المرافق هو :

H_3O^+ () HF ()

F^- () H_2O ()

6- الصيغة الكيميائية للقاعدة المرافقة للماء هي :

O^{2-} () OH^- ()

OH () H_3O^+ ()

7- في التفاعل التالي : $\text{HCl}_{(aq)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+_{(aq)} + \text{Cl}^-_{(aq)}$


() يعتبر كاتيون الهيدرونيوم حمضاً مرافقاً للماء .

() يعتبر الماء حمضاً مرافقاً لكاتيون الهيدرونيوم .

() يعتبر HCl قاعدة مرافقة لأيون الكلوريد .

() يعتبر أيون الكلوريد قاعدة مرافقة لكاتيون الهيدرونيوم .

8- أحد الأنواع التالية لا يعتبر حمضا حسب تعريف برونستد - لوري ، وهو :



9- في التفاعل التالي : $Ag^+ + 2 : NH_3 \longrightarrow [Ag(:NH_3)_2]^+$

() تعتبر الأمونيا حمض لويس

() يعتبر كاتيون الفضة حمض لويس

() يعتبر كاتيون الفضة قاعدة لويس

() يرتبط كاتيون الفضة مع الأمونيا برابطة أيونية

10- أحد الأنواع التالية يعتبر حمضاً حسب مفهوم لويس فقط :



11- المادة التي لها القدرة على إعطاء بروتون (H^+) لمادة أخرى ، تسمى :

() حمض لويس

() حمض برونستد - لوري

() قاعدة أرهينيوس

() قاعدة برونستد - لوري

12- العبارة الصحيحة من العبارات التالية هي :

() حمض لويس له القدرة على إستقبال زوج أو أكثر من الإلكترونات

() قاعدة لويس لها القدرة على إستقبال زوج من الإلكترونات

() حمض برونستد - لوري له القدرة على إستقبال بروتون أو أكثر

() قاعدة برونستد - لوري لها القدرة على إعطاء بروتون أو أكثر

تسمية الأحماض و القواعد

الأحماض

« ثلاثية » أكسجينية

أحماض تحتوي على ثلاث
عناصر ولها الصيغة العامة



« ثنائية » غير أكسجينية

أحماض تحتوي على عنصرين
فقط هما الهيدروجين وعنصر
آخر أكثر سالبة كهربائية



أولاً : تسمية الأحماض غير الأكسجينية :


	HF
	HCl
	HBr
	HI
	HCN
	H ₂ S



ثانياً: تسمية الأحماض الأكسجينية :

تعتمد التسمية على للذرة المركزية في الحمض الأكسجيني

عدد التأكسد =



التسمية	عدد التأكسد
	+ 1
	+ 3 , + 4
	+ 5 , + 6
	+ 7

إذا كانت الذرة المركزية كربون « C »
فإن للحمض اسماً واحداً



حالة
استثنائية

أمثلة :

العنصر ×	عدد التأكسد	الصيغة	الاسم
Cl	1+	HClO	
	3+	HClO ₂	
	5+	HClO ₃	
	7+	HClO ₄	
S	4+	H ₂ SO ₃	
	6+	H ₂ SO ₄	
N	3+	HNO ₂	
	5+	HNO ₃	
P	3+	H ₃ PO ₃	
	5+	H ₃ PO ₄	
C	4+	H ₂ CO ₃	
Cr	6+	H ₂ CrO ₄	

تسمية القواعد :

القاعدة	Al(OH) ₃	هيدروكسيد الروبيديوم	هيدروكسيد الباريوم	هيدروكسيد الحديد II	NaOH	Ca(OH) ₂
الاسم		هيدروكسيد الروبيديوم	هيدروكسيد الباريوم	هيدروكسيد الحديد II	هيدروكسيد البوتاسيوم	هيدروكسيد البوتاسيوم

كاتيونات الهيدروجين والحموضة



$$K_w =$$

عند الدرجة
25 °C

التأين الذاتي للماء :

التفاعل الذي يحدث
بين جزيئي الماء
لإنتاج أنيون
الهيدروكسيد وكاتيون
هيدرونيوم

حاصل ضرب تركيز كاتيونات الهيدرونيوم
وأنيونات الهيدروكسيد في الماء

المحلول

قاعدي

متعادل

حمضي

$$K_w = [H_3O^+] \times [OH^-] = 1 \times 10^{-14}$$

$$[H_3O^+] =$$

$$[OH^-] =$$

أمثلة :


- 1- إذا كان تركيز أنيون الهيدروكسيد لمحلول مائي ما يساوي $1 \times 10^{-3} M$ فما هو تركيز كاتيون الهيدرونيوم في المحلول ؟ وهل المحلول حمضي أم قلوي أم متعادل ؟

نوع المحلول	تركيز انيون الهيدروكسيد	تركيز كاتيون الهيدرونيوم
		1×10^{-5}
	1×10^{-5}	
		1×10^{-7}
	2×10^{-8}	
		4×10^{-9}

الأس الهيدروجيني PH و الأس الهيدروكسيدي POH

الأس الهيدروكسيدي : القيمة
السالبة للوغاريتم العشري لتركيز
أيون الهيدروكسيد

الأس الهيدروجيني : القيمة
السالبة للوغاريتم العشري لتركيز
كاتيون الهيدرونيوم



القاعدي


المحلول الذي له أس
هيدروجيني أكبر من
7 وأس هيدروكسيدي
أقل من 7

المتعادل

المحلول الذي له أس
هيدروجيني يساوي 7
وأس هيدروكسيدي
يساوي 7

الحمضي

المحلول الذي له أس
هيدروجيني أقل من
7 وأس هيدروكسيدي
أكبر من 7



1- الأس الهيدروجيني لمحلول تركيز كاتيون الهيدرونيوم فيه

يساوي 1×10^{-4}

2- تركيز كاتيون الهيدرونيوم في محلول أسه الهيدروجيني

يساوي 6

3- الأس الهيدروكسيدي لمحلول تركيز انيون الهيدروكسيد فيه

يساوي 1×10^{-2}

4- تركيز أنيون الهيدروكسيد في محلول أسه الهيدروكسيدي

يساوي 13

5- تركيز كاتيون الهيدرونيوم في محلول أسه الهيدروكسيدي

يساوي 8

مراجعة التسمية و الأس الهيدروجيني :

1- الحمض الثلاثي البروتون من بين المركبات التالية هو :

H_2SO_3 [] NH_3 []

$\text{Al}(\text{OH})_3$ [] H_3PO_4 []

2- المركب الذي له الصيغة HBrO_2 يُسمى :

[] حمض البروميك [] حمض البروموز

[] حمض الهيرو بروميك [] حمض البير بروميك

3- المركب الذي له الصيغة H_2CO_3 يُسمى :

[] حمض الكربونوز [] حمض الهيدروكربونيك

[] حمض الكربونيك [] حمض بير كربونيك

4- المركب الذي له الصيغة HClO_4 يسمى :

[] حمض الكلوريك [] حمض الهيوكلوروز

[] حمض البيركلوريك [] حمض الكلوروز

5- الصيغة الكيميائية لحمض الفوسفوروز هي :

H_3PO_4 [] H_3PO_3 []

HPO_3 [] H_3PO_2 []

6- المحلول المتعادل هو المحلول الذي يكون فيه تركيز كاتيون الهيدرونيوم $[\text{H}_3\text{O}^+]$:



[] يساوي $[1 \times 10^{-5} \text{ M}]$ عند 25°C

[] يساوي تركيز أنيون الهيدروكسيد OH^-


[] أكبر من تركيز أنيون الهيدروكسيد OH^-

[] أقل من تركيز أنيون الهيدروكسيد OH^-





7-المعادلات التالية تمثل مراحل تأين حمض الفوسفوريك ، عدا معادلة واحدة منها ، وهي :



8- تركيز كاتيون الهيدرونيوم يكون أكبر ما يمكن في محلول أحد الأحماض التالية المتساوية التركيز وعند نفس درجة الحرارة ، وهو محلول حمض :







9- الصيغة الكيميائية للحمض المرافق للأيون التالي $[\text{HPO}_4^{2-}]$ هي :




10- أضعف الأحماض التالية هو حمض :



11- أحد الأحماض التالية لا يعتبر من الأحماض ثنائية البروتون (ثنائية القاعدية) ، وهو حمض :



12- أكثر المحاليل التالية قاعدية (الأقل حمضية) عند درجة حرارة (25°C) هو الذي يكون فيه :



13- إذا كانت قيمة ثابت تأين الماء (Kw) تساوي (5.76×10^{-14}) عند (50°C) فإن تركيز كاتيون الهيدرونيوم $[\text{H}_3\text{O}^+]$ فيه يساوي :

() يساوي $4.166 \times 10^{-8} \text{ M}$ () يساوي $2.4 \times 10^{-7} \text{ M}$

() أقل من $2.4 \times 10^{-7} \text{ M}$ () يساوي $1 \times 10^{-7} \text{ M}$

14- تركيز كاتيون الهيدرونيوم $[\text{H}_3\text{O}^+]$ في المحلول المائي لحمض الأسيتيك وعند (25°C)

() يساوي $1 \times 10^{-7} \text{ M}$ () أكبر من $1 \times 10^{-7} \text{ M}$

() أقل من $1 \times 10^{-7} \text{ M}$ () أقل من تركيز أنيون الهيدروكسيد .

15- المحلول الحمضي من بين المحاليل التالية التي درجة حرارتها (25°C) يكون فيه تركيز :

() كاتيون الهيدرونيوم $1 \times 10^{-7} \text{ M}$ $\text{PH} = 7$ () أنيون الهيدروكسيد $2 \times 10^{-12} \text{ M}$ $\text{PH} = 2.3$

() كاتيون الهيدرونيوم $2 \times 10^{-12} \text{ M}$ $\text{PH} = 11.7$ () أنيون الهيدروكسيد $1 \times 10^{-2} \text{ M}$ $\text{PH} = 12$

16- حاصل جمع (pH ، pOH) يساوي (14) عند (25°C) :

() للمحاليل الحمضية فقط () للمحاليل القاعدية فقط

() للمحاليل المتعادلة فقط () لجميع المحاليل المائية

17- إذا كان تركيز أنيون الهيدروكسيد في محلول مائي يساوي (1×10^{-5}) عند (25°C) فإن :

() الأس الهيدروكسيدي pOH للمحلول تساوي (9) والمحلول حمضي .

() الأس الهيدروجيني pH للمحلول تساوي (5) والمحلول متعادل .

() الأس الهيدروجيني pH للمحلول تساوي (9) والمحلول حمضي .

() الأس الهيدروكسيدي pOH للمحلول تساوي (5) والمحلول قاعدي .

18- المحلول الأكثر حمضية من بين المحاليل التالية والتي درجة حرارتها (25°C) الذي يكون :

() الأس الهيدروجيني له 12 $\text{PH} = 12$ () الأس الهيدروكسيدي له 3.5 $\text{PH} = 10.5$

() تركيز كاتيون الهيدرونيوم فيه $1 \times 10^{-7} \text{ M}$ () تركيز أنيون الهيدروكسيد فيه $1 \times 10^{-2} \text{ M}$

$\text{PH} = 7$ $\text{PH} = 12$

الأحماض و القواعد القوية والضعيفة

الأحماض الضعيفة

الأحماض التي تتأين جزئياً في محاليلها المائية وتشكل حالة اتزان.



A	البدء	0	0
-x	التفاعل	+x	+x
A-x	الانتهاء (الاتزان)	x	x



أمثلة:

الأحماض القوية

الأحماض التي تتأين بشكل تام في محلول مائي



A	البدء	0	0
0	الانتهاء	A	A



القواعد الضعيفة

القواعد التي تتأين جزئياً في محاليلها المائية وتشكل حالة اتزان.



A	0	0
-x	+x	+x
A-x	x	x



مثال

القواعد القوية

القواعد التي تتأين بشكل تام في محاليلها المائية.




A	0	0
0	A	A



A	0	0
0	A	2A



ثابت تأين الحمض الضعيف K_a و القاعدة الضعيفة K_b



$$K_b = \frac{[\text{OH}^-] \cdot [\text{الحمض المرافق}]}{[\text{القاعدة}]}$$

$$K_b = \frac{[\text{OH}^-]^2}{[\text{BOH}]}$$



$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+] \cdot [\text{القاعدة المرافقة}]}{[\text{الحمض}]}$$


$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]^2}{[\text{HA}]}$$

1. اكتب معادله تفاعل التأين كل من المركبين التاليين في الماء



2. اكتب تعبير لـ K_a لكل حمض من الأحماض التالية علماً بأن ذرة

هيدروجين واحدة فقط تتأين



- إذا كانت قيمه K_a لحمض النيتروز 4.4×10^{-4} بينما تساوي قيمة K_a لحمض الأستيك 1.8×10^{-5}


فإن حمض **النيتروز** أكثر تأيناً وأقوى في المحلول من حمض **الأستيك**

- كلما كانت قيمة pK_a أكبر ، كلما صغرت قيمة K_a وكان الحمض أضعف والعكس صحيح

تفسير بعض التعاليل :

1] لا يوجد ثابت اتزان في تفاعل تأين الاحماض القوية
بسبب عدم وجود حالة اتزان وذلك بسبب التأين
التام للحمض ولا يبقى حمض غير متأين .

2] لحمض الفوسفوريك H_3PO_4 ثلاث ثوابت تأين



لأنه يتأين
معطياً ثلاث
ذرات H ←

3] لا يوجد ثابت اتزان في تفاعل تأين القواعد القوية

نفس التحليل 1

4] القواعد القوية مثل هيدروكسيد الكالسيوم وهيدروكسيد المغنسيوم

شحيحة الذوبان في الماء ولكنها قواعد قوية

لأن الكميات الصغيرة التي تذوب في الماء من هذه
القواعد تتأين تماماً فهي قوية .

5] اذا اضيفت عينة من حمض قوي الى حجم كبير من الماء فسوف تعطي

محلولاً مخففاً ولكنه يبقى حمضاً قوياً

لأن كل العينة ستكون في صورة متأينة .

قوي
مخفف
ضعيف

قوي
مركز
ضعيف



قلب الأم ...
بعمره ما يخذلك

الشرع راع يكون
على المنصة
للمشاركين

الكورس الثاني ما فيه غشمة
من الحين لحق واشترك

قلب الأم
الصف الثاني عشر